


REGISTRE D'ÉLEVAGE COMPLET AVEC LA METHODE APIFORME

Notice d'application de la méthode Apiforme® pour le suivi de l'évolution des colonies.



APIFORME®

Complément alimentaire naturel à base de plantes et d'huiles essentielles, conçu pour renforcer la santé des abeilles, stimuler le couvain et améliorer la production de miel.



SPRAY

Apiforme® 20 g +
Sirop 50 g +
Eau 930 g

FLASH

À pulvériser sur les cadres pour assainir et stimuler.

PUR

Apiforme® 80 ml +
Sirop 120 ml +
Eau 800 ml

PAR DÉGOUTEMENT

Dose de 60 ml par ruche, à déposer sur la tranche des cadres

PUR

Apiforme® pur 1 ml dans la coupelle de sublimation de l'appareil

PAR SUBLIMATION

Sublimation entre Noël et l'an (évite d'ouvrir les ruches en hiver)

CANDI (à froid)

Apiforme® + Candi mélanger à froid

PAIN D'APIS

Candi enrichi en Apiforme et en protéines.

SIROP

Apiforme® 20 g +
Sucre 2000 g +
Eau 1 l

OPEN BAR

Pour nourrir les abeilles. Ajouter 1 L d'eau 24 ou 48 h avant la distribution pour une dissolution optimale.

Rappel : Le sirop peut être stocké par les abeilles dans les hausses, contrairement au candi, consommé.

BILAN ANNUEL

Année :

Lieu et N° du rucher :

Quantité totale d'Apiforme utilisée :

Observations (santé, couvain, population) :

État général des colonies :

. Varroa détecté ? oui non Quantité estimée :

. Signes de maladies ? oui non

. Ruches orphelines ? oui non




. Essaimage observé ? oui non

. Miel récolté (kg) :

. Notes personnelles ou remarques pour l'année suivante :

. Améliorations constatées (santé, couvain, production) :

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN APPLICATION DE LA METHODE APIFORME®

<i>Périodes</i>	<i>Objectifs</i>	<i>Mode d'application</i>	<i>Produits Apiforme</i>
1ère visite de printemps	<i>De mars jusqu'à la fin des récoltes si nécessaire</i>	Lors de la première visite de printemps, pulvériser Apiforme par spray sur chaque face des cadres. 1 ou 2 passages selon l'état de la colonie.	SPRAY FLASH 
	<i>De mars à avril (sans hausse)</i>	Stimulation des colonies après l'hiver.	SIROP Open Bar® 
Durant le printemps	<i>De mai à juin, dès la pose des hausses</i>	Soutien aux jeunes essaims et reines. Assurer un apport d'Apiforme® aux butineuses durant cette période.	SIROP Open Bar®  PAIN DAPIS® 
	<i>De août à septembre, juste après les récoltes</i>	Assainir les cadres Protection du couvain. Préparation à l'hivernage.	SPRAY FLASH®  PAR DÉGOUTTEMENT 
Automne	<i>De septembre jusqu'au changement d'heure</i>	Préparation à l'hivernage. Renforcement des défenses immunitaires avant l'hiver.	SIROP Open bar® 
Hiver	<i>Passage à l'heure d'hiver et jusqu'à la fin d'hiver</i>	Renforcement des défenses immunitaires avant l'hiver. Prévient des carences.	PAIN DAPIS® 
	<i>Entre Noël et jour de l'an</i>	Renforcement des défenses immunitaires.	PAR SUBLIMATION 

Respecter un dosage de 0,5 % d'Apiforme® par ruche (10 ml pour 2 L de sirop). Adapter la fréquence selon l'état des colonies et leurs besoins spécifiques. Conserver les produits dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.